

**Zulassungsstatus von Arzneimitteln in der Behandlung der ADHS
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Stand Januar 2020)**

Psychostimulanz: Methylphenidat - nicht retardiertes MPH	
Equasym® 10 mg, Medikinet® 5-10-20 mg, *MPH-...® 10 mg, Ritalin® 10 mg Tbl.	im Alter 6 - 17 Jahre
Psychostimulanz: Methylphenidat - retardiertes MPH	
Concerta® 18, 27, 36, 54 mg Kps.	ab Alter 6 Jahre
Equasym® ret. 10-20-30 mg Kps.	im Alter 6 - 17 Jahre
Kinecteen® 18, 27, 36, 54 mg Tbl.	ab Alter 6 Jahre <i>ab Alter 18 Jahre, nur wenn erfolgreich vorbehandelt</i>
Medikinet® ret. 5-10-20-30-40-50-60 mg Kps.	im Alter 6 - 17 Jahre
Medikinet® adult 5-10-20-30-40-50-60 mg Kps.	<i>ab Alter 18 Jahre</i>
*Methylphenidat ...® Ret., 18, 27, 36, 54 mg Kps.	ab Alter 6 Jahre <i>ab Alter 18 Jahre, nur wenn erfolgreich vorbehandelt</i>
Ritalin® LA 10-20-30-40-60 mg Kps.	im Alter 6 - 17 Jahre
Ritalin adult® 10-20-30-40-60 mg Kps.	<i>ab Alter 18 Jahre</i>
Psychostimulanz: D-Amfetaminhemisulfat	
Attentin® 5-10-20 mg Tbl.	im Alter 6 - 17 Jahre, „second line“ Mittel
Amfetaminhemisulfat-Saft 0,2% (m/V) (NRF 22.4.) 1 ml = 2 mg DL-Amfetaminsulfat	ab dem Alter von 3 Jahren bis 17 Jahre
Psychostimulanz: Lisdexamfetamin	
Elvance® 20-30-40-50-60-70 mg Kps.	im Alter 6 - 17 Jahre „second line“ Mittel
Elvance® Adult 30-50-70 mg Kps.	<i>ab Alter von 18 Jahre</i>
Nicht-Stimulanz: Atomoxetin	
Strattera®, Agakalin®, * Atomoxetin ...® 10-18-25-40-60-80-100 mg Kps./Filmtbl.	<i>ab Alter von 6 Jahren und Erwachsene</i>
Nicht-Stimulanz: Guanfacin	
Intuniv® 1-2-3-4 mg Ret.Tbl.	im Alter 6 - 17 Jahre „second line“ Mittel
* Methylphenidat ...®, Atomoxetin ...® : „ ... steht für Firmennamen“	