

Zulassungsstatus von Arzneimitteln in der Behandlung der ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (gemäß Fachinformationen Januar 2022)	
Psychostimulanz: Methylphenidat - nicht retardiertes MPH als Tablette	
Medikinet® 5-10-20 mg, Equasym® ..., *MPH-...®, Ritalin® 10 mg	... bei Kindern ab 6 Jahren ...
Psychostimulanz: Methylphenidat - retardiertes MPH als Hartkapsel/Retardtablette	
Concerta® 18, 27, 36, 54 mg Hartkps.	... bei Kindern ab ... 6 Jahren Weiterbehandlung im Erwachsenenalter (1) - keine Neueinstellung Erwachsener (!)
Equasym® ret. 10, 20, 30, 40, 50 mg Hartkps. Metiphenal® 10, 20, 30 mg Hartkps. (identisch Equasym ret®)	... bei Kindern ab ... 6 Jahren ...
Knechten® 18, 27, 36, 54 mg Retardtablette	... bei Kindern ab 6 Jahren kann es angebracht sein, die Therapie im Erwachsenenalter fortzuführen. ... (2) - keine Neueinstellung Erwachsener (!)
Methysym® 10-20-30-40-50-60 mg Hartkps.	... Kindern ab ... 6 Jahren und Jugendlichen unter 18 Jahren
Medikinet® ret. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps. Medikinet® adult 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren ...
Methylphenidat® -ratio, -AL 10, 20, 30, 40, 60 mg Hartkps. *Methylphenidat ...® 18, 27, 36, 54 mg Hartkps.	... bei Kindern ... ab 6 Jahren und Erw. ... [Altersbereich in Fachinfo prüfen]
Ritalin® LA 10, 20, 30, 40 mg Hartkps. Ritalin adult® 10, 20, 30, 40 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren bei Erwachsenen indiziert.
Psychostimulanz: D-Amfetaminhemisulfat	
Attentin® 5, 10, 20 mg Tbl.	... im Alter von 6 - 17 Jahren ... „second line“ Anwendung (3)
Amfetaminhemisulfat-Saft 0,2% (m/V) (NRF 22.4.) 1 ml = 2 mg DL-Amfetaminsulfat	... im Alter von 3 Jahren bis 17 Jahren
Psychostimulanz: Lisdexamfetamin	
Elvanse® 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg Hartkps. Elvanse® Adult 30, 50, 70 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren ... „second line“ Anwendung (3) ... wird ... bei Erwachsenen angewendet.
Nicht-Stimulanz: Atomoxetin	
Agakalin®, *Atomoxetin - ...®, Strattera® 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg Filmtbl. / Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen ...
Nicht-Stimulanz: Guanfacin	
Intuniv® 1, 2, 3, 4 mg Retardtablette	... im Alter von 6 – 17 Jahren ... „second line“ Anwendung (3)
* MPH - ...®, Methylphenidat -...®, Atomoxetin -...®: [„-...“ steht für Firmennamen]	

- (1) „... kann eine Weiterbehandlung in das Erwachsenenalter erforderlich sein.“ (keine Zulassung für E.)
- (2) „... kann es angebracht sein, die Therapie im Erwachsenenalter fortzuführen.“ (keine Zulassung für E.)
- (3) „... für die eine Behandlung mit Stimulanzien nicht in Frage kommt oder unverträglich ist oder sich als unwirksam erwiesen hat.“