

<b>Zulassungsstatus von Arzneimitteln in der Behandlung der ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (gemäß Fachinformationen Stand 03/2023)</b>	
<b>Psychostimulanz: Methylphenidat - nicht retardiertes MPH als Tablette</b>	
Medikinet® 5-10-20 mg, Equasym® ..., *MPH-...® ..., Ritalin® 10 mg	... bei Kindern ab 6 Jahren ...
<b>Psychostimulanz: Methylphenidat - retardiertes MPH als Hartkapsel/Retardtablette</b>	
Concerta® 18, 27, 36, 54 mg Hartkps.	... ab einem Alter von 6 Jahren und bei Erwachsenen ...i
Equasym® ret. 10, 20, 30 mg Hartkps.	... bei Kindern ab ... 6 Jahren ...
Kinecteen® 18, 27, 36, 54 mg Retardtablette	... bei Kindern ab 6 Jahren ... ... Therapie im Erwachsenenalter ... (2) - keine Neueinstellung Erwachsener (!)
Medikinet® ret. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps.  Medikinet® adult 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren ...  ... bei Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren ...
Methysym® 10-20-30-40-50-60 mg Hartkps.	... Kindern ab ... 6 Jahren und Jugendlichen unter 18 Jahren ...
*Methylphenidat ...® Ret., 18, 27, 36, 54 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren ... ... Therapie im Erwachsenenalter ... (2) - keine Neueinstellung Erwachsener (!)
Ritalin® LA 10, 20, 30, 40 mg Hartkps.  Ritalin adult® 10, 20, 30, 40 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren ...  ... bei Erwachsenen indiziert.
<b>Psychostimulanz: Amfetamin</b>	
Attentin® 5, 10, 20 mg Tbl. (Dexamfetaminhemisulfat - stärkere Wirkung als Amfetaminsulfat)	... im Alter von 6 - 17 Jahren ... „second line“ Anwendung (!)
Amfetaminsulfat-Saft 0,2% (m/V) (NRF 22.4.) 1 ml = 2 mg DL-Amfetaminsulfat	... im Alter von 3 Jahren bis 17 Jahren
<b>Psychostimulanz: Lisdexamfetamin</b>	
Elvanse® 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg Hartkps.  Elvanse® Adult 30, 50, 70 mg Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren ... ... Fortsetzung der Behandlung ins Erwachsenenalter ... (2) „second line“ Anwendung (!) ... bei Erwachsenen angewendet.
<b>Nicht-Stimulanz: Atomoxetin</b>	
Agakalin®, * Atomoxetin ...®, Strattera® 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg Filmtbl./ Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen ...
<b>Nicht-Stimulanz: Guanfacin</b>	
Intuniv® 1, 2, 3, 4 mg Retardtablette	... im Alter von 6 – 17 Jahren ... „second line“ Anwendung (3)
* MPH ...®, Methylphenidat ...®, Atomoxetin ...®: „...“ steht für Firmennamen	

- (1) „... kann eine Weiterbehandlung in das Erwachsenenalter erforderlich sein.“ (keine Zulassung!)
- (2) „... kann es angebracht sein, die Therapie im Erwachsenenalter fortzuführen.“ (keine Zulassung!)
- (3) „... für die eine Behandlung mit Stimulanzien nicht in Frage kommt oder unverträglich ist oder sich als unwirksam erwiesen hat.“