

**Zulassungsstatus von Psychostimulanzien in der Behandlung der ADHS
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (gemäß Rote Liste Fachinformationen Stand 09/2025)**

Psychostimulanz: Methylphenidat - nicht retardiertes MPH als Tablette/Saft	
Medikinet® 5-10-20 mg, (*) MPH-...® Tbl.	... bei Kindern ab ... 6 Jahren ..., wenn ...
Ritalin® 10 mg Tbl.	... Ritalin darf nicht bei älteren Patienten (Anmerk.: ab 60 Jahren) angewendet ...
Ritalin® Saft 2 mg/ml	... ab einem Alter von 6 Jahren indiziert, wenn ...
Psychostimulanz: Methylphenidat - retardiertes MPH als Hartkapsel/Retardtablette	
Concerta® 18, 27, 36, 54 mg Retardtbl.	... ab einem Alter von 6 Jahren und ... bei Erwachsenen ...
Equasym® ret. 10, 20, 30, 40, 50 mg Hartkps.	... bei Kindern ab ... 6 Jahren ..., wenn ...
Kinecteen® 18, 27, 36, 54 mg Retardtbl.	... bei Kindern ab 6 Jahren und bei Erwachsenen ...
Medikinet® ret. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps. Medikinet® adult 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg Hartkps.	... bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 ... Jahren und älter und Erwachsenen angewendet, ... bei Erwachsenen ab ... 18 Jahren ...
(*) Methylphenidat ...® Ret., 18, 27, 36, 54 mg Retardtbl. (*) Methylphenidat ...® 10-20-30-40-60 mg Hartkps.	... bei Kindern ab einem Alter von 6 Jahren und Erwachsenen ..., wenn ...
Ritalin® LA 10, 20, 30, 40 mg Hartkps. Ritalin adult 10, 20, 30, 40 mg Hartkps.	... bei Kindern und Jugendlichen ab einem Alter von 6 Jahren und Erwachsenen indiziert, zur Behandlung von ADHS bei Erwachsenen ... first line Anwendung
Psychostimulanz: Amfetamin	
Attentin® 5, 10, 20 mg Tbl. (Dexamfetaminhemisulfat)	... im Alter von 6 - 17 Jahren ... second line Anwendung (1)
Amfetaminsulfat-Saft 0,2% (m/V) (NRF 22.4.) 1 ml = 2 mg DL-Amfetaminsulfat	... im Alter von 3 Jahren bis 17 Jahren - z. Zt. nicht lieferbar!
Psychostimulanz: Lisdexamfetamin	
Elvanse® 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg Hartkps. Lisdexamfetamin ratio 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg Hartkps. Lisdexamfetamin-ratio Erwachsene, 30, 50, 70 mg Hartkps.	... bei Kindern ab ... Alter von 6 Jahren ... second line Anwendung (1) ... bei Erwachsenen mit bereits in der Kindheit bestehenden ADHS-Symptomen ... angewendet first line Anwendung
Lisdexamfetamin® Stada 20, 30, 40, 50, 60, 70 mg Hartkps.	... zwischen 6 und 18 Jahren, bei denen ... sich ... Methylphenidat als unzureichend ... erwiesen ... second line Anwendung (1) ... Gegebenenfalls ... als Erwachsener weiter einnehmen, wenn ... von Behandlung deutlich profitiert ...
Lisdex-Aristo Lösung 10mg/ml	... ab einem Alter von 6 Jahren indiziert, ... wenn ... Methylphenidat als klinisch unzureichend angesehen wird. second line Anwendung (1)
Nicht-Stimulanz: Atomoxetin	
Atomoxetin ...®, Strattera ...® Agakalin ...* 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg Filmtbl./ Hartkps.	... bei Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen ... first line Anwendung
Nicht-Stimulanz: Guanfacin	
Intuniv® 1, 2, 3, 4 mg Retardtbl. (kein Psychostimulanz!)	... im Alter von 6 – 17 Jahren ... second line Anwendung (1)
(*) MPH ...®, Methylphenidat ...®, Atomoxetin ...®, Lisdexamfetamin „...“ ... - steht für Firmennamen	
(1) second line Anwendung: z. B.: „... für die eine Behandlung mit Stimulanzien nicht in Frage kommt oder unverträglich ist oder sich als unwirksam erwiesen hat.“	